

Короткая шпаргалка по севообороту

Чтобы быстро сориентироваться и правильно чередовать культуры на грядках, сохраните эту памятку. Здесь собраны лучшие и худшие предшественники для самых популярных овощей.

Картофель лучше всего сажать после бобовых (горох, фасоль, бобы), сидератов (горчица, фацелия, овес), тыквенных (огурцы, кабачки, тыквы) и капусты. Эти культуры оставляют после себя рыхлую, плодородную почву, обогащённую азотом.

Категорически нельзя сажать картофель после пасленовых (томаты, перцы, баклажаны) и самого картофеля — у них общие болезни (фитофтора) и вредители (колорадский жук), а также они выносят одни и те же питательные вещества из почвы.

Томаты отлично растут после бобовых, корнеплодов (морковь, свекла) и огурцов. А вот после пасленовых и картофеля сажать томаты нельзя — риск заражения фитофторой и вертициллёзным увяданием слишком высок, к тому же растения будут конкурировать за одни и те же элементы питания.

Огурцы и кабачки — культуры, которые лучше всего сажать после бобовых, корнеплодов и пасленовых. Бобовые обогащают почву азотом, корнеплоды рыхлят землю, а пасленовые не имеют общих с тыквенными болезней.

Плохие предшественники — любые тыквенные культуры (огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны). У них общие вредители и болезни, и они выносят одинаковые питательные вещества.

Морковь и свекла хорошо растут после ранних пасленовых (томаты, перцы, баклажаны, которые убирают в июле-августе), капусты и бобовых.

Нельзя сажать корнеплоды после других корнеплодов — они истощают глубокие слои почвы, и у них могут быть общие почвенные вредители (проволочник, личинки майского жука). Оптимальный перерыв между посадками корнеплодов на одном месте — 3-4 года.

Лук и чеснок — лучшие предшественники: корнеплоды (морковь, свекла), бобовые и тыквенные. Категорически нельзя сажать лук и чеснок после лука и чеснока — у них общие вредители (луковая муха, луковый скрытнохоботник) и болезни (луковая гниль, пероноспороз).

Возвращать луковичные на прежнее место можно только через 4-5 лет. Лучший способ оздоровить почву после лука и чеснока — посеять сидераты (горчица, фацелия, овес).

Капуста и другие крестоцветные (редис, репа, дайкон, редька) лучше всего растут после бобовых, пасленовых, тыквенных и лука. Эти культуры не имеют общих с капустой

болезней и вредителей. А вот после других крестоцветных сажать капусту нельзя категорически — у них общий враг: кила капусты (грибковое заболевание, которое живёт в почве до 5-7 лет). Также не рекомендуется сажать капусту после свёклы и шпината.

Общие правила для всех культур:

- Не сажайте культуры одного семейства друг после друга (пасленовые после пасленовых, крестоцветные после крестоцветных, тыквенные после тыквенных)
- Возвращайте культуру на прежнее место не раньше чем через 3-4 года
- Лучшие предшественники для большинства культур — бобовые (горох, фасоль, бобы) и сидераты
- Если соблюдать севооборот невозможно (очень маленький участок), после уборки урожая обязательно сейте сидераты
- Картофель и томаты — не лучшие соседи и предшественники друг для друга из-за фитофторы
- Чеснок и лук — хорошие предшественники для большинства культур, так как они дезинфицируют почву